



Inhalt

[Wer sollte eine Auffrischungsimpfung bekommen?](#)

[Wer sollte eine zweite Auffrischungsimpfung bekommen?](#)

[Wann sollte eine Auffrischungsimpfung vorgenommen werden?](#)

[Auffrischungsimpfung mit Omikron-adaptierten Impfstoff möglich](#)

[Wo erhält man die Auffrischungsimpfung?](#)

[Weitere Informationen](#)

Wer sollte eine Auffrischungsimpfung bekommen?

Laut der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) sollten grundsätzlich **alle Personen ab 12 Jahren** eine Auffrischungsimpfung, auch Booster-Impfung genannt, erhalten.

Die STIKO empfiehlt die Auffrischungsimpfung **auch für 12- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche** mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Booster-Impfung wird für das Zeitfenster von **3 bis 6 Monaten nach der zweiten Impfung**, also nach der abgeschlossenen Grundimmunisierung, empfohlen.

Wer sollte eine zweite Auffrischungsimpfung bekommen?

!Wichtig: Die STIKO hat am 18. August 2022 eine **zweite Booster-Impfung** empfohlen für:

- Menschen ab **60 Jahren**
- Bewohner:innen in Einrichtungen der Pflege
- sowie in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen
- Personen mit Immundefizienz (ID) ab dem Alter von 5 Jahren
- Personen im Alter ab 5 Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung

Die **vierte Impfung** soll laut STIKO frühestens **6 Monate nach der dritten COVID-19-Impfung oder nach einer Corona-Infektion** erfolgen. In begründeten Einzelfällen kann der Abstand auf 4 Monate reduziert werden. Bei **Personen mit Immunschwäche** soll der Abstand zwischen erster und zweiter Auffrischimpfung **wie bisher 3 Monate** betragen.

Unter gewissen Umständen ist eine **fünfte Impfung** zu empfehlen, wenn die letzte Impfung oder die Genesung 6 Monate zurückliegt. Das gilt bei besonders Gefährdeten, etwa Hochbetagten. Voraussetzung ist eine ärztliche Empfehlung.

Wann sollte eine Auffrischungsimpfung vorgenommen werden?

Alle Personen ab 12 Jahren	etwa 3 Monaten nach der Grundimmunisierung
Schwangere, ab dem zweiten Trimester	etwa 3 Monaten nach der Grundimmunisierung, mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer
Personen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden	1. Optimierung der Grundimmunisierung nach 4 Wochen 2. Booster-Impfung nach Optimierung der Grundimmunisierung nach 3 Monaten

Genesene, die mind. eine Impfung erhalten haben	etwa 3 Monaten nach der Grundimmunisierung
---	--

Auffrischungsimpfung mit Omikron-adaptierten Impfstoff möglich

Auf Grundlage eines neuen Erlasses sollen ab sofort die Auffrischungsimpfungen mit einem an Omikron angepassten Impfstoff erfolgen. Dies teilte der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit. Der aktualisierte Erlass basiert auf dem Beschlusssentwurf der Ständigen Impfkommision (STIKO). Für kommunalen Impfangabote gilt nun: Auffrischungsimpfungen ab 12 Jahren sind vorzugsweise mit einem der Omikron-adaptierten mRNA-Impfstoffe durchzuführen.

Wo erhält man die Auffrischungsimpfung?

Grundsätzlich dürfen alle impfberechtigten Leistungserbringer auch die Booster-Impfung vornehmen. Zu diesen Leistungserbringern zählen:

- mobile Impfteams
- weitere Impfstellen der Länder
- niedergelassene Ärztinnen und Ärzte
- Betriebsärztinnen und Betriebsärzte
- Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
- Krankenhäuser
- Vorsorge- und Reha-Einrichtungen

Hier finden Sie Impfangabote in NRW:

- [Die Landesregierung NRW \[externer Link\]](#)
- [Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe \[externer Link\]](#)
- [Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein \[externer Link\]](#)

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit unter ["Zusammen gegen Corona" \[externer Link\]](#).

Ein Service des Pflegewegweiser NRW - www.pflegewegweiser-nrw.de